

EXERCICE 1

5 points

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct (O, \vec{u}, \vec{v}) unité graphique : 4 cm.

On considère le point A d'affixe $z_A = 2 + i$ et le cercle (Γ) de centre A et de rayon $\sqrt{2}$.

1. Faire une figure qui sera complétée tout au long de l'exercice.
2.
 - a. Déterminer les affixes des points d'intersection de (Γ) et de l'axe $(O; \vec{u})$.
 - b. On désigne par B et C les points d'affixes respectives $z_B = 1$ et $z_C = 3$. Déterminer l'affixe z_D du point D diamétralement opposé au point B sur le cercle (Γ) .
3. Soit M le point d'affixe $\frac{3}{5} + \frac{6}{5}i$.
 - a. Calculer le nombre complexe $\frac{z_D - z_M}{z_B - z_M}$.
 - b. Interpréter géométriquement un argument du nombre $\frac{z_D - z_M}{z_B - z_M}$; en déduire que le point M appartient au cercle (Γ) .
4. On note (Γ') le cercle de diamètre [AB]. La droite (BM) recoupe le cercle (Γ') en un point N.
 - a. Montrer que les droites (DM) et (AN) sont parallèles.
 - b. Déterminer l'affixe du point N.
5. On désigne par M' l'image du point M par la rotation de centre B et d'angle $-\frac{\pi}{2}$.
 - a. Déterminer l'affixe du point M'.
 - b. Montrer que le point M' appartient au cercle (Γ') .

EXERCICE 2

5 points

Enseignement obligatoire

Partie A

On considère deux points A et D de l'espace et on désigne par I le milieu du segment [AD].

1. Démontrer que, pour tout point M de l'espace, $\vec{MD} \cdot \vec{MA} = MI^2 - IA^2$.
2. En déduire l'ensemble (E) des points M de l'espace, tels que $\vec{MD} \cdot \vec{MA} = 0$.

Partie B :

Dans l'espace rapporté au repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, les points A, B, C et D ont pour coordonnées respectives :

$$A(3 ; 0 ; 0), B(0 ; 6 ; 0), C(0 ; 0 ; 4) \quad \text{et} \quad D(-5 ; 0 ; 1).$$

1.
 - a. Vérifier que le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ est normal au plan (ABC).
 - b. Déterminer une équation du plan (ABC).
2.
 - a. Déterminer une représentation paramétrique de la droite Δ , orthogonale au plan (ABC) passant par D.
 - b. En déduire les coordonnées du point H, projeté orthogonal de D sur le plan (ABC).
 - c. Calculer la distance du point D au plan (ABC).
 - d. Démontrer que le point H appartient l'ensemble (E) défini dans la partie A.

EXERCICE 2**5 points****Enseignement de spécialité**

L'espace est rapporté au repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On nomme (S) la surface d'équation $x^2 + y^2 - z^2 = 1$.

1. Montrer que la surface (S) est symétrique par rapport au plan (xOy) .
2. On nomme A et B les points de coordonnées respectives $(3 ; 1 ; -3)$ et $(-1 ; 1 ; 1)$.
 - a. Déterminer une représentation paramétrique de la droite (D) passant par les points A et B.
 - b. Démontrer que la droite (D) est incluse dans la surface (S).
3. Déterminer la nature de la section de la surface (S) par un plan parallèle au plan (xOy) .
4.
 - a. On considère la courbe (C), intersection de la surface (S) et du plan d'équation $z = 68$. Préciser les éléments caractéristiques de cette courbe.
 - b. M étant un point de (C), on désigne par a son abscisse et par b son ordonnée.

On se propose de montrer qu'il existe un seul point M de (C) tel que a et b soient de entiers naturels vérifiant $a < b$ et $\text{ppcm}(a ; b) = 440$, c'est-à-dire tel que (a, b) soit solution du système

$$(1) : \begin{cases} a < b \\ a^2 + b^2 = 4\,625 \\ \text{ppcm}(a ; b) = 440 \end{cases}$$

Montrer que si (a, b) est solution de (1) alors $\text{pgcd}(a ; b)$ est égal à 1 ou 5.

Conclure

Dans cette question toute trace de recherche même incomplète ou d'initiative, même non fructueuse sera prise en compte dans l'évaluation.

EXERCICE 3**6 points****Commun à tous les candidats**Soit f la fonction définie sur l'intervalle $]1; +\infty[$ par

$$f(x) = \ln x - \frac{1}{\ln x}.$$

On nomme (\mathcal{C}) la courbe représentative de f et Γ la courbe d'équation $y = \ln x$ dans un repère orthogonal (O, \vec{i}, \vec{j}) .

1. Étudier les variations de la fonction f et préciser les limites en 1 et en $+\infty$.
2.
 - a. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - \ln x]$.
Interpréter graphiquement cette limite.
 - b. Préciser les positions relatives de (\mathcal{C}) et de Γ .
3. On se propose de chercher les tangentes à la courbe (\mathcal{C}) passant par le point O.
 - a. Soit a un réel appartenant à l'intervalle $]1; +\infty[$.
Démontrer que la tangente \mathcal{T}_a à (\mathcal{C}) au point d'abscisse a passe par l'origine du repère si et seulement si $f(a) - af'(a) = 0$.
Soit g la fonction définie sur l'intervalle $]1; +\infty[$ par

$$g(x) = f(x) - xf'(x).$$

- b. Montrer que sur $]1; +\infty[$, les équations $g(x) = 0$ et $(\ln x)^3 - (\ln x)^2 - \ln x - 1 = 0$ ont les mêmes solutions.
 - c. Après avoir étudié les variations de la fonction u définie sur \mathbb{R} par $u(t) = t^3 - t^2 - t - 1$ montrer que la fonction u s'annule une fois et une seule sur \mathbb{R} .
 - d. En déduire l'existence d'une tangente unique à la courbe (\mathcal{C}) passant par le point O.
La courbe (\mathcal{C}) et la courbe Γ sont données en annexe.
Tracer cette tangente le plus précisément possible sur cette figure.
4. On considère un réel m et l'équation $f(x) = mx$ d'inconnue x .
Par lecture graphique et sans justification, donner, suivant les valeurs du réel m , le nombre de solutions de cette équation appartenant à l'intervalle $]1; 10]$.

EXERCICE 4**4 points****Commun à tous les candidats**On considère les suites (x_n) et (y_n) définies pour tout entier naturel n non nul par :


$$x_n = \int_0^1 t^n \cos t \, dt \quad \text{et} \quad y_n = \int_0^1 t^n \sin t \, dt.$$

1.
 - a. Montrer que la suite (x_n) est à termes positifs.
 - b. Étudier les variations de la suite (x_n) .
 - c. Que peut-on en déduire quant à la convergence de la suite (x_n) ?

2. **a.** Démontrer que, pour tout entier naturel n non nul, $x_n \leq \frac{1}{n+1}$.
- b.** En déduire la limite de la suite (x_n) .
3. **a.** À l'aide d'une intégration par parties, démontrer que, pour tout entier naturel n non nul, $x_{n+1} = -(n+1)y_n + \sin(1)$.
- b.** En déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = 0$.
4. On admet que, pour tout entier naturel n non nul, $y_{n+1} = (n+1)x_n - \cos(1)$.
Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} nx_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} ny_n$.

Annexe

Cette page est à compléter et à remettre avec la copie à la fin de l'épreuve

Exercice 3**Représentations graphiques obtenues à l'aide d'un tableur**

— Courbe Γ représentative de la fonction \ln

- - - Courbe \mathcal{L} représentative de la fonction f